

Esercizio 1 Si usi il metodo dei residui per calcolare i seguenti integrali.

- a) $\int_{\gamma} \frac{1}{1 - \cos z} dz$ dove γ parametrizza la circonferenza di centro 0 e raggio 6;
- b) $\int_{\gamma} \frac{1}{z(z-1)(z-3)^2} dz$ dove γ parametrizza il rettangolo di vertici $-2, 2, -2i, 2i$;
- c) $\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 \vartheta}{5 + 3 \sin \vartheta} d\vartheta$;
- d) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \sin \vartheta \cos \vartheta} d\vartheta$;
- e) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x+4}{(x^2+2x+2)(x^2+9)} dx$;
- f) $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx$;
- g) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx$;
- h) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{4-x^2} dx$.

Esercizio 2 Si usi il metodo dei residui per calcolare la trasformata di Fourier della funzione $f(x) = \frac{1}{x^2+x+1}$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega x} \frac{1}{x^2+x+1} dx.$$

Soluzioni:

1. a) 0; b) $\frac{5}{18}\pi i$; c) $\frac{2}{9}\pi$; d) $\frac{4}{\sqrt{15}}\pi$; e) $\frac{13}{51}\pi$; f) $\frac{\pi}{4}$; g) $\frac{\pi}{e}$; h) $-\pi \cos 2$.
- 2) $\frac{2\pi}{\sqrt{3}} e^{\frac{i\omega}{2}} e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}|\omega|}$.